

The background of the slide features several anatomical drawings. On the left, there is a portrait of a man in a white lab coat. The rest of the background is composed of various anatomical sketches, including a profile of a head and neck, a detailed view of a shoulder joint, and a view of a person's torso and arms. The text is overlaid on these drawings.

Patologie della spalla e del gomito

Dott Michele Trevisan


Dott Michele Trevisan

Patologie da usura spalla gomito



Patologie della spalla

Cuffia dei rotatori



SOVRASPINATO

INFRASPINATO

PICCOLO ROTONDO

CLB



SOTTOSCAPOLARE

Patologie della spalla



I tendini che compongono
la cuffia dei rotatori
avvolgono la testa dell'omero


Patologie della spalla



Una lesione di questi tendini può comportare una discinesia scapolo omerale e quindi comparsa di dolore

Patologie della spalla

- tendinite della cuffia dei rotatori
- rottura dei tendini della cuffia dei rotatori
- tendinite calcifica della cuffia dei rotatori
- tendinite del capo lungo del bicipite brachiale
- patologie dell articolazione acromionclaveare




Patologie della spalla

Entesopatia dei tendini che compongono la cuffia dei rotatori

- attività ripetitiva
- manovalanza (muratori, imbianchini)
- confezionamento
- maglieria
- pulizie e servizi
- mansioni con braccia sopra la testa

Patologie della spalla

- tendinite calcifica della cuffia dei rotatori




Incidenza

- Donne
- 18-50 anni
- non traumi
- non correlata ad attività




Patologie della spalla

- tendinite calcifica della cuffia dei rotatori






Patologie della spalla

- rottura della cuffia dei rotatori



Patologie della spalla

- rottura della cuffia dei rotatori



Patologie della spalla

TRAUMATICA



DEGENERATIVA



ENTRAMBE

Patologie della spalla

Epidemiology of Rotator Cuff Tears MRI asymptomatic volunteers

(Sher et al JBJS A 1995)

■ <40

- No tear 96%
- Partial tear 4%

■ >40<60

- No tear 72%
- Partial tear 24%
- Full tear 4%

■ >60

- No tear 46%
- Partial tear 26%
- Full tear 28%



Patologie della spalla



Giovani

Traumi

Patologie della spalla




Sopra 60 aa

Traumi

**Trattamento
riabilitativo
senza risultati**



Patologie della spalla



Talvolta le lesioni non sono riparabili allora possiamo ricorrere diversi tipi di interventi


Patologie della spalla

tendinite del capo lungo
del bicipite brachiale





Patologie della spalla

patologie della articolazione acromion
claveare



Patologie della spalla

patologie della articolazione acromion
claveare




Patologie del gomito

- entesopatia dei muscoli estensori (epicondilite)
- enteropatia dei muscoli flessori (epitrocleite)
- entesopatia del capo distale del bicipite brachiale
- compressione del nervo ulnare al (fuc)
- compressione del nervo interosseo posteriore

Patologie del gomito

Entesopatia dei muscoli estensori (epicondilite)

- macellai
- insaccati
- confezionamento
- operai con avvitatori
- utilizzatori di forbici



Patologie del gomito

Entesopatia dei muscoli flessori (epitrocleite)



Patologie del gomito

Entesopatia dei muscoli flessori (epitrocleite)



- macellai
- insaccati
- confezionamento
- operai con avvitatori
- utilizzatori di forbici
- *sollevatori di pesi con braccio supinato*



Patologie del gomito


Compressione del nervo ulnare al FUC

- *sollevatori di pesi con braccio supinato*



Patologie del gomito

- 1.2 su 100000
- evento traumatico: flessione contro resistenza con mano supinata



Patologie del gomito

Lesione del capo distale del bicipite brachiale

J Bone Joint Surg Am. 1985 Mar;67(3):414-7.

Rupture of the distal tendon of the biceps brachii. Operative versus non-operative treatment.

Baker BE, Bierwagen D.

Abstract


We did Cybex testing of thirteen patients who had had a rupture of the distal tendon of the biceps brachii. The tests were performed fifteen months to six years after injury. The ten patients who had had a surgical repair through the two-incision technique showed a return to normal levels of strength and endurance with regard to both flexion of the elbow and supination of the forearm. The three patients who had had conservative treatment showed a remaining deficit in those parameters which was clinically evident in several activities, such as use of a screwdriver or baseball bat.

PMID: 3972865 [PubMed - Indexed for MEDLINE]

PMID: 3972865 [PubMed - Indexed for MEDLINE]

indicazioni alla ricostruzione

- riduzione del 30% forza in flessione dell'avambraccio
- riduzione del 40% forza di supinazione



A close-up photograph of two hands clasped together in a gesture of prayer or gratitude. The hands are positioned centrally, with fingers interlaced. The skin tone is light. The background is a soft-focus indoor setting with warm, bokeh-style light spots. Overlaid on the hands is the word "GRAZIE" in a large, bold, yellow serif font with a white outline and a slight drop shadow.

GRAZIE